

各位老師好:

近日腸胃型感冒學生有增加情形，請各位老師多加關心及了解學生請假原因，如有下列情形請隨時通報健康中心。**阻斷腸胃道群聚之感染鏈(手-糞-口)最好的方式，就是洗手。請提醒學生經常洗手**

通報疾病 (請打√)	相關症狀 (其他)
A. <input type="checkbox"/> 腸病毒(手足口症或皰疹性咽峽炎)	1.發燒 2.口腔有潰瘍 3.手腳出疹、水泡 4.其他
B. <input type="checkbox"/> 頭蝨	1.頭皮搔癢 2.發現疑似蟲卵 3.發現疑似蟲體 4.其他
C. <input type="checkbox"/> 疥瘡	1.皮膚搔癢 2.皮膚出現紅點 3.其他
D. <input type="checkbox"/> 水痘	1.全身水泡 50 顆以上 2.全身水泡 50 顆以下
E. <input type="checkbox"/> 流感【※有發燒且併有其他 1 種(含 1 種)以上症狀】	1.發燒 2.頭痛 3.咳嗽 4.喉嚨痛 5.流鼻水 6.肌肉酸痛
F. <input type="checkbox"/> 腹瀉(輪狀病毒或諾羅病毒)	1.發燒 2.腹瀉 3.嘔吐
G. <input type="checkbox"/> 急性出血性結膜炎(紅眼症)	1.眼睛紅 2.結膜充血 3.分泌物增加 4.怕光 5.流淚 6.淋巴腫大
H. <input type="checkbox"/> 其他(含腮腺炎等)	

※備註:

1. **水痘**：為防範學生交互傳染擴大流行，應要求學生於**皮疹一出現後至少應停止上學 5 天，或是至水疱變乾為止**，或視病情決定停課時間長短。
2. **流感**：學生經醫生診斷為流感時，除依醫師指示治療外，請假在家休息至**症狀解除後 24 小時才可返校上課**，建議返校時先戴口罩上課，以避免將病毒傳染給其他人。
3. **感染諾羅病毒**生病學童應請假在家休息，**直至症狀解除後 48 小時才可返校上學**，避免將病毒傳染給其他人。
4. 其他則依傳染病特性進行相關防疫與防護措施。

※環境消毒濃度:

消毒水請到健康中心領取，領取時如有個案發生請記得告知，才能依比例給予。

1. 一般環境消毒：漂白水:自來水=1cc:100cc 的濃度
2. 有腸病毒個案發生：漂白水:自來水=1cc:50cc 的濃度
3. 有嘔吐個案發生：漂白水:自來水=1cc:10cc 的濃度(也能以原液做消毒不需稀釋)

※消毒方式:

1. 請戴上口罩及手套進行消毒，請以擦拭方式做消毒。
2. 當學生在教室內或其他區域嘔吐時，**第一時間請以舊報紙或抹布等覆蓋嘔吐物(覆蓋的抹布應丟棄)**，再倒上 1:10 的消毒水，再由外往內擦拭嘔吐區，待 10-15 分鐘後，再用清水擦拭即可。

※消毒時注意事項:

1. 稀釋的漂白水，應當天使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。
2. 不要與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。當漂白水 and 酸性清潔劑(如一些潔廁劑、鹽酸)混合時，會產生有毒氣體(如氯氣)，可能造成傷害或死亡。如有需要，應先使用清潔劑並用水充分清洗後，才用漂白水消毒。
3. 請勿使用不透氣之玻璃瓶，長期盛裝 5-6%漂白水，以避免累積氣壓而爆炸，**應使用塑膠瓶盛裝。**